

مقدمه

قلب های گچی برای بی حرکت کردن بافت عضلانی و اسکلتی به دنبال تروما و یا جراحی استفاده می شود. این قالب های گچی از گچ پلاستیک و فایبر گلاس یا نوارهای گچی ساخته می شود. فایبرگلاس دارای برخی مزایا نسبت به گچ می باشند چرا که این قالب ها در صورت مرطوب شدن، صدمه جدی به آنها وارد نمی شود، سبک وزن هستند و برای مدت طولانی تری قابل استفاده می باشند. بانداژ گچی که به صورت نواری و یا حلقه پیچیده شده در دسترس می باشد پس از فرو بردن در آب بر روی بخش آسیب دیده پیچیده می شود. این قالب به شکل عضو آسیب دیده خشک شده و فرم می گیرد. معمولاً در زیر قالب گچی از یک بانداژ نرم یا پنبه استفاده می شود تا گچ به طور مستقیم با پوست در تماس نباشد.



۱

سلامتی و تندرستی شما آرزوی ماست

مراقبت از قالب گچی

- قالبهای گچی از جنس گچ ۲ تا ۳ روز و قالب های فایبرگلاس طی یک روز خشک می شوند. تا زمانی که قالب گچی مرطوب است، آن را بر روی یک بالش سفت بدون روکش پلاستیکی قرار دهید تا از بد شکل شدن قالب جلوگیری نمایید.

- تا زمانی که گچ خشک می شود در زیر آن احساس گرما وجود دارد ولی اگر پس از خشک شدن قالب گچی در عضو گرما احساس شود می تواند علامت عفونت باشد و باید فوراً به پزشک مراجعه نمود.

- از نوشتن یا رنگی کردن گچ جداً بپرهیزید.

- برای این که قالب گچی زودتر خشک شود، برای سرعت بخشیدن به خشک شدن گچ می توان از پنکه در فاصله ای مناسب استفاده کرد.

- برای خشک کردن قالب گچی نباید از لامپ های حرارتی استفاده کرد. چون ممکن است باعث سوختگی پوست زیر قالب گچی شود.


- جهت حمام رفتن و یا بیرون رفتن در هوای بارانی چنانچه قالب گچی از جنس گچ باشد برای قالب با کیسه پلاستیکی پوشانده شود.

۲

سلامتی و تندرستی شما آرزوی ماست

- از وارد کردن وسایل تیزی مانند تکه چوب یا قطعات پلاستیکی یا فلزی به زیر قالب گچی خودداری نمایید چون در صورت زخمی شدن پوست زیر قالب گچی احتمال عفونت وجود خواهد داشت.

- اندام گچ گیری شده را تا یک هفته بالاتر از سطح قلب نگاه دارید.



- در صورت تورم اندام گچ گیری شده یا تغییر رنگ و کم شدن یا از بین رفتن حس اندام سریعاً به پزشک خود مراجعه نمایید.

- بیمار تا ۴۸ ساعت پس از گچ گیری، با پای دارای قالب گچی نباید راه برود مگر پزشک دستور دیگری در این رابطه داشته باشد.

۳

سلامتی و تندرستی شما آرزوی ماست



بیمارستان شهدا بندرلنگه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان

بیمارستان شهدا بندرلنگه

مراقبت پس از گچ گیری



شناسنامه پمفلت آموزشی

کد: QM.SH.PA.183.00

عنوان	مراقبت پس از گچ گیری
تهیه کننده	فاطمه رادبه (سوپروایز آموزش سلامت)
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۴۰۱
ناظر کیفی	دکتر شجاعی (متخصص ارتوپدی)

سلامتی و تندرستی شما آرزوی ماست

موارد هشدار دهنده:

- در صورت ترک برداشتن، سست شدن و یا گشاد شدن زیاد از حد قالب گچی.
- درد و زخم زیر قالب گچی که با تغییر وضعیت دادن عضو تسکین پیدا نمی کند.
- سردی انگشتان دست یا پا که پس از ۲۰ دقیقه پوشاندن، گرم نشوند.
- افزایش تورم
- سوزن سوزن شدن یا احساس سوزش
- بوی تعفن اطراف لبه های گچی
- هر گونه شکستگی قالب گچی

منبع: برونر و سودارث پرستاری

- در صورتی که گچ دچار تغییر رنگ یا بوی بد گردید، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.

- برای پاک کردن لکه های روی قالب گچی، می توان از یک پارچه تمیز و مرطوب و پودرهای تمیز کننده استفاده نمود.

- ورزش های تقویت عضلات اندام زیر گچ را به طور مرتب انجام دهید تا قدرت عضلانی اندام حفظ شود. مانند شل و سفت کردن عضلات ران و زانو و مچ و ...

- رژیم غذایی سرشار از کلسیم و ویتامین و پروتئین داشته باشید.



- روزانه حداقل ۳ لیتر مایعات به خصوص آب بنوشید.

- در صورت کاهش یافتن تورم و گشاد شدن قالب گچی، ممکن است برای اطمینان از بی حرکت بودن استخوان های شکسته و جابجا نشدن آنها، نیاز باشد تا قالب گچی توسط پزشک تعویض شود.