

## آتروپین

دسته دارویی: آنتی کولینرژیک

(افزایش ضربان قلب، کاهش عملکرد سیستم گوارشی و ادراری، میدریاز  
مردک ها، کاهش عملکرد غدد و خشکی دهان، برونکودیلاتور)

شکل دارویی: آمپول ۰.۵ / میلی گرم در ۱ سی سی

موارد تجویز:

- برادی کاردی سینوسی
- مسمومیت با ارگانوفسفرها

دوز مصرف آتروپین در اطفال:  $0.02 \text{ mg/kg}$  / ۰

دوز مصرف در بزرگسالان: ۱ میلی گرم هر از ۳ تا ۵ دقیقه

حداکثر دوز مصرفی: ۳ میلی گرم معادل ۶ آمپول

عوارض جانبی:

خشکی دهان، تاکیکاردی بطنی، احتباس ادراری، سردرد، فیبریلاسیون بطنی

ملاحظات پرستاری:

- مانیتورینگ بیمار و کنترل سرعت و ریتم نبض
- مراقب اثرات معکوس و برادی کاردی اولیه به ویژه در بیمارانی که دوز پایین مصرف می کنند باشید.
- مراقب بروز تاکیکاردی در بیماران قلبی باشید در صورت عدم توجه منجر به فیبریلاسیون بطنی می شود.

شروع اثر دارو آتی و اوج اثر آن ۲-۴ دقیقه می باشد.