

نکات مهم آمیودارون

آمپول ۳ سی سی حاوی ۱۵۰ میلی گرم آمیودارون

موارد مصرف :

✓ آریتمی بطنی و فوق بطنی (آچار فرانسه قلب)
✓ تاکیکاردی بطنی، تاکیکاردی دهلیزی، فلاتر بطنی
و دهلیزی

مکانیسم اثر:

طولانی کردن مرحله استراحت قلب (بلوک کننده کانال پتاسیم)

پروتکل آمیودارون:

دوز Rapid : ۱۵۰ میلی گرم در ۱۰۰ سی سی سرم طی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

دوز Slowly ۳۶۰ میلی گرم طی ۶ ساعت (1mg/min)

دوز Maintenance : ۵۴۰ میلی گرم طی ۱۸ ساعت
(./5mg/min)

حتما با سرم % D/W۵ رقیق شود

**در CPR بعد از شوک سوم ... دوز اول در CPR ۳۰۰ میلی گرم
دوز دوم ۱۵۰ میلی گرم**

• عوارض:

- شایعترین عارضه..... هایپوتنشن و برادی کاردی
- مهمترین عارضه: مسمومیت ریوی (سرفه ، تنگی نفس؛ التهاب
الوئول و پنومونی) مسمومیت کبدی

• :N.C

- مانیتورینگ بیمار، چک عملکرد ریوی و تست های کبدی

پنجاب سائنس و ٹیکنالوجی
یونیورسٹی