

نکات کلیدی در تزریق خون

- ❖ هنگام وصل خون به بیمار توجه داشته باشید که هیچ گونه دارو یا سرم دیگری از همان Line به بیمار ندهید .
- ❖ کیسه خون تحویل گرفته از آزمایشگاه را ، با برگ درخواست خون از لحاظ : نام بیمار ، نوع فرآورده درخواستی ، BG ، RH ، داشتن تاریخ انقضاء و بقیه نکات مندرج در برگ درخواست خون ، چک کنید .
- ❖ کیسه خون را از نظر وجود حبابهای هوا (نشانه رشد باکتری) و رنگ غیر عادی و کدورت خون (نشانه همولیز) مورد مشاهده قرار دهید .
- ❖ در طی 15 دقیقه اول ، سرعت تزریق خون آهسته بوده و در صورت عدم وجود عوارض جانبی می توان سرعت قطرات را افزایش داد .
- ❖ در حین تزریق خون به خصوص 15-30 دقیقه اول ، مراقب واکنش به تزریق خون باشید و V/S بیمار را در فواصل منظم کنترل نمایید .
- ❖ طول زمان تزریق از 4 ساعت نباید تجاوز کند زیرا خطر تکثیر باکتریایی وجود دارد .
- ❖ بیمار را از لحاظ بروز نشانه های واکنش های جانبی مانند : افزایش گردش خون ، واکنش تب زا ، واکنش آلرژیک کنترل کنید .
- ❖ برای کاهش خطر آلودگی ، ست های تزریق خون را بعد از هر تزریق 1 واحد خون ، تعویض کنید .
- ❖ علائم حیاتی را کنترل و با مقادیر پایه مقایسه نمایید .
- ❖ موارد استفاده شده مانند : ست فیلتردار و کیسه خون و... را حتماً در سطل های عفونی (زرد) بریزید .

عوارض انتقال خون

- 1- واکنش غیر همولتیک تب زا
- 2- واکنش همولتیک حاد
- 3- واکنش آلرژیک
- 4- واکنش هایپرولمی
- 5- آسیب ریوی حاد
- 6- عفونت باکتریال

با تشکر