

عفونت ادراری در کودکان

عفونت ادراری در کودکان شایع بوده و تا سن 5 سالگی 8 درصد دختر بچه ها و 1 تا 2 درصد پسر بچه ها تا سن 11 سالگی حداقل یکبار مبتلا به عفونت ادراری شده اند.

صرفاً در سال اول حیات شیوع عفونت ادراری در پسر بچه ها بیشتر بوده و خطر آن در کودکان ختنه نشده زیر یکسال 5 تا 12 بار بیشتر است.

عفونت ادراری معمولاً از مثانه شروع شده و گاهی کلیه ها را نیز درگیر میکند، عفونت ادراری میتواند علامت دار یا بدون علامت باشد.

گاهی عفونت ادراری بصورت راجعه رخ می دهد و عود مکرر دارد.

** درجه (اسفنکتر) ادراری

شایع ترین عامل عفونت، ورود میکروب از طریق این مجرا است.

** علل عفونت ادراری

مصرف کم مایعات نیز خطر پیدایش عفونت ادراری را افزایش می دهد.

یبوست مزمن، عدم رعایت بهداشت، اختلال ساختاری دستگاه ادراری، ضعف سیستم ایمنی، برگشت ادرار از مثانه به کلیه، سابقه خانوادگی

** علائم بیماری

بر اساس سن متفاوت هستند:

در نوزادان شامل:

* نارسایی رشد * مشکلات تغذیه

* تب * اسهال

* استفراغ

* کولیک همراه با

جیغ زدن

در کودکان 2 ساله شامل:

فوریت در دفع ادرار

سوزش ادرار

تکرر ادرار

درد شکم

** تشخیص

در شیرخواران و کودکان کم سن


تشخیص عفونت ادراری دشوارتر

است، با کشت ادرار اغلب می توان

عامل بیماری را حساسیت آنتی

بیوتیکی آنرا تشخیص داد. جواب کشت

طی 24 تا 48 ساعت آماده میشود.



شناسه پمفلت:

QM.SH.PA.126.00

عنوان	عنوان
بخش اطفال	عفونت ادراری در کودکان
تأمید کننده	تأمید کننده
منبع	برونز و سودارث
سال تهیه	فروردین 1401
ناظر کیفی	دکتر دیوان زاده (متخصص اطفال) فاطمه رادبه (سوپروایزر آموزشی)

* توصیه به انجام ختنه در پسر بچه

های زیر یکسال

* تشویق کودک به ادرار کردن هر

2 تا 3 ساعت

* تشویق کودک بهمصرف مایعات

* منع کودک از مصرف مواد

محرک نظیر شکلات، کافئین و

نوشابه های گازدار

* شستشوی دستگاه تناسلی از جلو و

عقب بویژه بعد از دفع مدفوع

* استفاده از لباس های زیر نخی و

گشاد و شستشو و تعویض مکرر

* پرهیز از وان حاوی کف صابون

در دختر بچه ها

* مدت زمان پوشک نوزاد زیاد

نباشد

در صورت اثبات عفونت ادراری

بررسی های تکمیلی شامل سونوگرافی

، عکس رنگی و سایر مطالعات

تشخیصی طبف نظر پزشک می باید

انجام پذیرد.

**** درمان**

در کودک با کشت ادرار مثبت و بدون

علائم بیماری، باید درمان آنتی بیوتیکی

از طریق تزریق یا خوراکی آغاز شود.

نوزادان مبتلا به عفونت ادراری طی

10 تا 14 روز مصرف آنتی بیوتیک

های تزریقی درمان می شوند.

**** اقدامات پیشگیرانه**

* درمان بیبوست کودک

