



دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  
بیمارستان شهدا بندرلنگه

هموفیلی یک بیماری ارثی و ژنتیکی است که علامت اصلی آن خونریزی زیاد و غیرقابل کنترل است



عنوان:	بیماری هموفیلی
تهیه کننده:	ستاره رهسپار
تاییدکننده:	کمیته آموزش به بیمار
منبع	برونر وسودارث
سال تهیه	فروردین ۱۴۰۱
ناظر کیفی	دکتر محمودی (فوق تخصص غدد) خانم رادبه (سوپروایزر آموزش)
بیمارستان شهدا	1401 فروردین



تشخیص:

علاوه بر شرح حال طبی کامل و معاینه فیزیکی، پزشک شما ممکن است تعدادی از آزمایش های خونی نظیر سطح فاکتورهای انعقادی، شمارش کامل سلول های خونی، را در DNA ارزیابی زمان خونریزی و تست درخواست نماید.

اثرات بیماری:

شایعترین علت ناتوانی ناشی از هموفیلی بیماریهای مفصلی مزمن هستند. بیماریهای مفصلی مزمن به علت خونریزی غیرقابل کنترل به درون مفاصل ایجاد می گردند. خونریزی شدید داخلی و خارجی از دیگر مشکلات مربوط به این بیماری می باشد.

درمان عبارت است از:

۱. جایگزین کردن فاکتورهای انعقادی خون از طریق تزریق
۲. درمان پیشگیری کننده (مراقبت شخصی توسط خود بیمار)

تعریف:

هموفیلی یک اختلال خونریزی دهنده ارثی است. فرد مبتلا به هموفیلی به علت سطح پائین یا عدم وجود پروتئین هایی به نام فاکتورهای انعقادی قادر به متوقف کردن روند خونریزی نمی باشد. فرآیند انعقاد خون به جلوگیری از خونریزی بیش از حد کمک می نماید.

### انواع مختلفی از هموفیلی وجود دارد

شایعترین و شناخته شده ترین آنها عبارتند از:

۱- کمبود فاکتور ۸ (هموفیلی ب)

۲- کمبود فاکتور ۹ (هموفیلی آ)



### علائم بیماری :

شایعترین علامت هموفیلی خونریزی غیرقابل کنترل و بیش از حد به علت کمبود یا عدم وجود فاکتورهای انعقادی در خون می باشد. خونریزی حتی می تواند بدون هیچ گونه آسیبی رخ دهد. خونریزی اغلب در مفاصل رخ می دهد.



. موارد زیر از دیگر علائم شایع هموفیلی می باشند.

**کبودی:** کبودی حاصل از صدمات کوچک .



### خونریزی:

تمایل به خونریزی از بینی، دهان و لثه ها با یک صدمه کوچک نظیر مسواک زدن یا اعمال دندانپزشکی اغلب نشانگر

### خونریزی داخل عضلات:

منجر به تورم، درد و قرمزی می شود. تورم ناشی از خونریزی در این مناطق از طریق افزایش فشار بر بافت ها و اعصاب ناحیه منجر به صدمات پایدار و بدشکلی می گردد.

خونریزی ناشی از صدمات یا خونریزی خودبخودی مغز شایعترین علت مرگ در کودکان مبتلا به هموفیلی و یکی از شدیدترین عوارض این بیماری است.

**محل های دیگر خونریزی:** وجود خون در

ادرار یا مدفوع نیز می تواند علامتی از هموفیلی باشد. علائم هموفیلی می تواند مشابه دیگر اختلالات خونی یا مشکلات طبی باشد.